

2002-1

Efterårsuglen *Lithophane semibrunnea* (Hw.)

- nu også udbredt til Nordfyn.

Otto Buhl

Denne art er endnu et eksempel på de efterhånden mange arter sommerfugle, der ekspanderer mere eller mindre hurtigt mod vest og nordvest i landet. Nu er det, som om det pludselig går hurtigere med *semibrunnea* her på Fyn. Måske er arten ubemærket vandret mod nord langs Storebælt og derpå mod nordvest hen over Nordfyn, eller også er det bare nordpå med stormskridt.

L. semibrunnea blev i efteråret 2001 meldt i enkeltfund fra 3 steder på Nordfyn: Enebærodde, 12.ix., Eskildstrup ved Bogense, 5.x. og Bøgebjerg på Hindsholm, 15.x.



Lithophane semibrunnea (Hw.) F: NG 9754 Enebærodde, 12.ix.2001 (O. Buhl, N. Lykke). Foto OB

Vingefang 41 mm

Arten blev meldt som ny for fynsområdet fra Langeland: Næbbeskov, 1978. Derefter fundet efterfølgende i Åstrup, 1979, Tåsinge: Vemmenæs, 1982 og Horne Næs, 1983.

Dette var enkeltfundene frem til 1991, hvor den blev genfundet med 2 stk. ved Horne Næs, samt nyfundet ved Gulstav med hele 28 stk. Denne sidste lokalitet med omgivelser (Lunden, Keldsnor) bliver fremover "stedet" for *semibrunnea*. Bortset fra 1992 bliver dyret fundet omkring Gulstav hvert år, i alt bliver der 1991-2001 meldt 101 eksemplarer.

Udover disse fund foreligger enkeltteksemplarer fra det nordlige Langeland: Snøde Hesselbjerg, 1993 samt fra Damsbo Strand, 2001 og Sandholt-Lyndelse, 5 stk. 2001.

Set på denne baggrund er fundene fra Nordfyn noget af et 'spring'. Det bliver spændende efterfølgende at se, om fremmarchen var alvorligt ment.

At *semibrunnea* også langsomt arbejder sig mod nordvest langs den sydfynske kyst ses af fundet ved Damsbo Strand.